

表25 女性の発達段階とうつ状態およびア症の原因（太田）

3

- 小・中学期
 - ①いじめられ ②登校拒否
- 中学・高校期
 - ①、②、③神経性食思不振症、非行、青い鳥症候群、シンナー乱用、家庭内暴力、対人恐怖
- 自立期
 - 進学と就職の葛藤、自立葛藤、性格未熟、性格逸脱、モラトリアム、女性としての同一化障害、食行動異常、Wrist cut syndrome、若年アルコール薬物依存
- 社会人期
 - 職場の葛藤、ストレス、転職、シンデレラ症候群
- 配偶者選択期
 - 結婚ノイローゼ、失恋、夫との性格不一致
- 出産・育児期
 - 産褥うつ病、育児期うつ、妊娠中絶後のうつ
- 中年期
 - 目標喪失、オールドミス型、もえつき症候群
- *中年初期
 - 家庭内ストレス └夫の酒乱、女性問題
 - 夫との無意識の競争 └子の非行、登校拒否、老人の介護疲れ
- *中年中期
 - 夫の単身赴任、夫の病死、夫の事故死、夫の病弱、嫁姑問題、離婚後の孤独、女としての自我の肥大、わがまま
- *中年後期
 - 空巣症候群、子の自立、女性性喪失、退行期うつ病、閉経期症候（のぼせ、発汗、不定愁訴）夫への嫌悪感
- 初老期
 - 夫の病弱と死亡、転居、生活目標喪失、配偶者介護疲れ
- 老年期
 - 老年期衰弱、老年期うつ病、不眠
- *～74 老年初期
 - 嫁姑問題、老人クラブや町内会での葛藤、病院依存、老年期うつ、引っ越し、うつ病
- *～84 老年中期
 - 入院、入所後のうつ、施設依存、不眠、老年期神経症（死への不安）
- *～95 老年後期
 - 老年期衰弱
- *以上のような原因で、神経症、心身症やうつ状態、飲酒などが常習化しやすい